

(Proef)blokkade van het ganglion stellatum

In overleg met uw arts heeft u besloten om het ganglion stellatum tijdelijk of voor langere periode te laten verdoven. In deze folder vindt u informatie over de behandeling, mogelijke complicaties en de uiteindelijke resultaten van de behandeling.



Rijnstate

*Neem altijd uw
verzekeringsgegevens
en identiteitsbewijs mee!*

Het ganglion stellatum is een zenuwknoop in de hals die vlak naast de adamsappel ligt. Deze zenuwknoop is verantwoordelijk voor onwillekeurige processen in de arm, zoals het reguleren van de bloedvoorziening, zweten, haargroei, nagelgroei en pijnsignalen. Door het ganglion stellatum tijdelijk of voor langere tijd te verdoven wordt geprobeerd invloed op deze processen te krijgen.

Algemeen

Deze behandeling vindt plaats in het Pijncentrum van Rijnstate Velp. U meldt zich op het afgesproken tijdstip. Een verpleegkundige brengt u naar de behandelkamer en haalt u na afloop van de behandeling ook weer op. U blijft na afloop nog enige tijd ter controle op het Pijncentrum. De behandeling zelf duurt meestal maximaal 15 minuten; de totale tijd die u doorbrengt op het Pijncentrum wisselt tussen een half uur tot hooguit 2 uur. Mocht het nodig zijn dat u langer blijft, dan kan dat uiteraard.

Behandeling

Bij een proefblokkade van het ganglion stellatum plaatst de anesthesioloog onder röntgendoorlichting een naaldje in de hals naast de adamsappel. U krijgt contrastvloeistof ingespoten, zodat de arts de positie van de naald kan controleren. Vervolgens krijgt u verdoving toegediend. Het effect van de behandeling houdt enkele uren aan. Bij een goed effect van de proefblokkade kan deze herhaald worden of kan het zinvol zijn het zenuwknopje door middel van warmte langdurig uit te schakelen. Bij patiënten die deze behandeling krijgen tegen opvliegers geldt dat er een sterkere verdoving wordt ingespoten die voor een aantal weken tot maanden de frequentie en de ernst van de opvliegers zou kunnen verminderen. Zo nodig volgt er een herhaling van deze behandeling na 6-8 weken.

Eten en drinken voor de behandeling

In principe hoeft u voor deze behandeling niet nuchter te zijn.

Complicaties

Bij elke ingreep, hoe zorgvuldig ook uitgevoerd, bestaat er een geringe kans op complicaties. Bij een proefblokkade van het ganglion stellatum kan het longvlies worden geraakt, waardoor een klaplong kan optreden. Dit is een zeer zeldzame complicatie. Indien nodig zal de arts u hier meteen voor behandelen.

De kans op complicaties, zoals infectie en bloeding ter hoogte van de injectieplaats en allergische reacties, is erg klein.

Bijwerkingen

Direct na de behandeling kunt u wat wazig zien en kan het ooglid wat hangen. Ook kunt u een hese stem hebben. Deze verschijnselen worden veroorzaakt door de plaatselijke verdoving en verdwijnen binnen enkele uren. In de hals kan gedurende enkele dagen napijn optreden. U kunt hiervoor een pijnstiller innemen zoals paracetamol. Volg voor de dosering altijd de aanwijzingen in de bijsluiter.

Resultaat

Het effect kan meestal meteen beoordeeld worden. Het is ook mogelijk dat u pas na enkele dagen effect bemerkt. Bij effect moet u denken aan vermindering van pijnklachten en verbeterde doorbloeding van de hand, waardoor deze warm wordt. Voor patiënten met opvliegers geldt dat in de dagen na de behandeling de opvliegers minder kunnen worden. Het uiteindelijke effect van de behandeling wordt telefonisch met u besproken, het kan nodig zijn de behandeling te herhalen.

Let op!

- Informeer uw arts of verpleegkundige vóór de behandeling over een (mogelijke) zwangerschap.
- Laat het ook vóór de ingreep weten als u allergisch bent voor jodium, contrastvloeistof of medicijnen.
- De dag van de behandeling mag u niet actief aan het verkeer deelnemen. Door de toegediende medicatie kan uw reactievermogen verminderd zijn. Zorgt u ervoor dat iemand u naar huis brengt.
- Als u antistollingsmiddelen (bloedverdunners) gebruikt (zoals Sintrom, Marcoumar of Acenocoumarol) waarvoor controle bij de trombosedienst noodzakelijk is, moet u hier (in overleg met uw trombosedienst) voor de behandeling mee stoppen.
- Als u bloedverdunners gebruikt buiten de trombosedienst om (zoals Ascal, Acetylsalicylzuur of Plavix), dan vertelt uw behandelaar u of u deze medicijnen tijdelijk niet mag innemen.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u contact opnemen met het Pijncentrum via 088-005 5311, op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur.

Bij Rijnstate kunt u telefonisch en voor de meeste specialismen via www.rijnstate.nl uw afspraak maken.

Rijnstate,
uw ziekenhuis in de
regio Arnhem, Rheden
en De Liemers.

 @rijnstate

 facebook.com/rijnstate

Rijnstate

Postbus 9555

6800 TA Arnhem

T 088 - 005 8888

E info@rijnstate.nl

www.rijnstate.nl