

Antistollingsbehandeling

Uw specialist heeft u antistollingtabletten (acenocoumarol, marcoumar of fenprocoumon) voorgeschreven. Voor de antistollingsbehandeling bent u verwezen naar de INR Trombosedienst. In deze folder leest u wat u van de Trombosedienst kunt verwachten. Op de achterkant vindt u een doseringsvoorschrift.

Informatie voor patiënten Rijnstate Arnhem/Velp



Rijnstate

**Neem altijd uw
verzekeringsgegevens
en identiteitsbewijs mee!**

Eerste bezoek aan de trombosedienst

De eerste keer komt een medewerker van de trombosedienst bij u aan huis en wordt bloed bij u afgenomen. Ook ontvangt u uitgebreide mondelinge en schriftelijke informatie over de antistollingsbehandeling. Op het laboratorium van de INR Trombosedienst wordt vervolgens de stollingstijd (INR) van uw bloed bepaald. Deze INR-uitslag vormt de basis voor het aantal tabletten dat u moet gaan slikken.

Als er in het ziekenhuis nog geen controledatum met u is afgesproken, dan neemt de trombosedienst telefonisch contact met u op om een afspraak te maken (de eerste werkdag na uw ontslag uit het ziekenhuis). Mocht dit onverhoopt niet gebeuren, neem dan zelf telefonisch contact op met de trombosedienst.

Controles

Zodra u de antistollingtabletten gebruikt, moet u regelmatig naar de Trombosedienst om uw bloed te laten controleren. Aan het begin van uw behandeling is dit twee keer per week. Dit wordt afgebouwd naar een controle van minimaal een keer in de zes weken. Het kan zijn dat de controle vervroegd wordt, bijvoorbeeld bij wisselende medicatie, in geval van ziekte of als u een bepaald onderzoek of een bepaalde ingreep moet ondergaan. Informatie hierover staat op de achterkant van de doseerbrief die u thuisgestuurd krijgt na een controle. Op deze doseerbrief vindt u ook de dosering voor de komende tijd en de volgende controledatum.

Het duurt een paar dagen voordat de antistollingtabletten een optimaal effect hebben. Daarom wordt de behandeling soms aangevuld met spuitjes onder de huid met een direct werkend middel. In dat geval moet u twee tot drie keer per week voor controle naar de Trombosedienst. De spuitjes zijn niet meer nodig als u minimaal vijf dagen behandeld bent en twee keer een goede INR-uitslag hebt gehad. U krijgt dan bericht dat u met de spuitjes kunt stoppen en alleen met de tabletten verder kunt gaan.

Als u mobiel bent vinden de controles op een prikpost bij u in de buurt plaats. Indien medisch noodzakelijk komt een medewerker van de Trombosedienst bij u aan huis prikken.

Tijdens de controle kan ook bloed worden afgenomen voor onderzoeken die door uw huisarts of specialist zijn aangevraagd. In dat geval is het belangrijk dat u een volledig ingevuld aanvraagformulier bij u hebt.

Bereikbaarheid

De INR Trombosedienst heeft twee locaties:

Arnhem Zuid

Rijnstate Arnhem-Zuid

Marga Klompelaan 6

Tel.: 088 - 005 66 55 (8.00 - 13.00 uur)

Fax: 088 - 005 76 16

Nijmegen

Burgemeester Daleslaan 27, 6532 CL Nijmegen

Tel.: 024 – 365 70 00

Fax: 024 – 365 51 85

website: www.inrtrombosedienst.nl

e-mail: trombosedienst@cwz.nl

Daarnaast zijn er in de regio ongeveer 120 prikposten die minimaal één keer per week geopend zijn.

Doseringsvoorschrift

Doseringsvoorschrift voor acenocoumarol, marcoumar of fenprocoumon

dag	datum	aantal tabletten	dag	datum	aantal tabletten
zondag			zondag		
maandag			maandag		
dinsdag			dinsdag		
woensdag			woensdag		
donderdag			donderdag		
vrijdag			vrijdag		
zaterdag			zaterdag		

Bij Rijnstate kunt u telefonisch en voor de meeste specialismen via www.rijnstate.nl uw afspraak maken.

Rijnstate,
uw ziekenhuis in de regio
Arnhem, Rheden en De
Liemers.

 @rijnstate

 facebook.com/rijnstate

Rijnstate

Postbus 9555

6800 TA Arnhem

T 088 - 005 8888

E info@rijnstate.nl

www.rijnstate.nl