

# Behandeling van het Ganglion Impar

U heeft met uw arts afgesproken dat u voor de pijnklachten in uw stuitje of perineum een behandeling van het Ganglion Impar zult ondergaan.

In deze folder vindt u informatie over de therapie, mogelijke complicaties en de resultaten van de behandeling.



Rijnstate

*Neem altijd uw  
verzekeringsgegevens  
en identiteitsbewijs mee!*

## Algemeen

De behandeling vindt plaats in het Pijncentrum van Rijnstate Velp. U meldt zich op het afgesproken tijdstip. Een verpleegkundige begeleidt u naar de behandelkamer en brengt u na afloop van de behandeling ook weer terug. U blijft na afloop nog enige tijd ter controle op het Pijncentrum. De behandeling zelf duurt meestal maximaal 15 minuten, de totale tijd die u doorbrengt op het Pijncentrum wisselt tussen een half uur tot hooguit 2 uur.

## De behandeling

Na een lokale verdoving van de huid, plaatst de anesthesioloog onder röntgendoorlichting een naald bij de te behandelen zenuwknoop, ter hoogte van het stuitje. De arts controleert de plaats van de naald met behulp van contrastmiddel. Als de naald goed staat, behandelt de anesthesioloog de zenuwknoop met medicatie of met radiofrequente golven.

Bij een 'RF-behandeling' wordt de zenuwknoop verhit door radiofrequente golven. Pijnvermindering treedt op door vermindering van de geleidingscapaciteit van de zenuwen.

Wordt het ganglion Impar medicamenteus behandeld, dan krijgt u een lokaal verdovingsmiddel (ropivacaine) en een ontstekingsremmend middel (depo-medrol®) toegediend.

## Eten en drinken voor de behandeling

In principe hoeft u voor dit onderzoek niet nuchter te zijn.

## Bijwerkingen

- Door de corticosteroiden injectie kunnen bij vrouwen opvliegers optreden en kan de menstruatie korte tijd verstoord zijn.

- Er bestaat een zeer geringe kans op verminderde betrouwbaarheid van orale anti-conceptie ('de pil') gedurende een menstruatiecyclus.
- Patiënten met suikerziekte die insuline gebruiken, merken na toediening van de injectie soms dat hun bloedsuikers gedurende enkele dagen verhoogd zijn.
- Ten gevolge van de injectie kan er enige napijn optreden, die enkele dagen kan aanhouden. U kunt hiervoor een pijnstillert innemen zoals paracetamol. Volg voor de dosering altijd de aanwijzingen in de bijsluiter.

## Resultaat

Het resultaat van de behandeling is pas na enkele dagen tot weken te beoordelen. In een aantal gevallen zal een herhaling of een aanvullende behandeling noodzakelijk zijn. Tijdens een controle afspraak zal de verpleegkundige of de specialist het resultaat en mogelijke verdere behandeling met u bespreken.

## Let op!

- Informeer uw arts of verpleegkundige vóór de behandeling over een (mogelijke) zwangerschap.
- Meld eventuele allergie voor jodium, contrastvloeistof of medicijnen vóór de ingreep plaatsvindt.
- De dag van de behandeling mag u niet actief aan het verkeer deelnemen. Door de toegediende medicatie kan uw reactievermogen verminderd zijn. Zorgt u ervoor dat iemand u naar huis brengt.
- Als u antistollingsmiddelen (bloedverdunners) gebruikt (zoals Sintrom, Marcoumar of Acenocoumarol) waarvoor controle bij de trombosedienst noodzakelijk is, moet u hier (in overleg met uw trombosedienst) voor de behandeling mee stoppen.
- Als u bloedverdunners gebruikt buiten de trombosedienst om,

zoals o.a. Ascal, Acetylsalicylzuur, Plavix, Dabigatran, Rivaroxaban, Apixaban), dan zal uw behandelaar u vertellen of er medicatie gestopt moet worden.

- Als de behandeling met de injectie in uw onderrug heeft plaats gevonden, bestaat de kans op tijdelijk krachtverlies in uw benen. Dit komt door de verdovende werking van de medicijnen uit de injectie. Houd hier rekening mee als u begint te lopen. Maak zo nodig gebruik van een rolstoel om bij de auto te komen. Het gevoel van krachtverlies houdt meestal enkele uren aan, daarna verdwijnt het langzaam en functioneren uw beenspieren weer als voor de behandeling.

## Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u contact opnemen met het Pijncentrum.

## Telefoonnummer

Het Pijncentrum is op werkdagen tussen 8.30 – 17.00 uur bereikbaar via telefoonnummer 088 - 005 5311.

Bij Rijnstate kunt u telefonisch en voor de meeste specialismen via [www.rijnstate.nl](http://www.rijnstate.nl) uw afspraak maken.

### Rijnstate

Postbus 9555  
6800 TA Arnhem  
T 088 - 005 8888  
E [info@rijnstate.nl](mailto:info@rijnstate.nl)  
[www.rijnstate.nl](http://www.rijnstate.nl)

### Ziekenhuislocaties

Arnhem  
Zevenaar  
Velp  
Dieren  
Arnhem-Zuid