

Victoza Vastentest (VVT)

U ondergaat een Victoza Vastentest om vast te stellen of u een te lage bloedsuikerspiegel (hypoglycemie) krijgt tijdens een periode van vasten, terwijl u het medicijn Victoza blijft gebruiken. In deze folder vindt u de belangrijkste informatie over dit onderzoek.



Rijnstate

**Neem altijd uw
verzekeringsgegevens
en identiteitsbewijs mee!**

Doel van het onderzoek

Het doel van de Victoza Vastentest is om te kijken hoe u Victoza moet gebruiken tijdens een periode van vasten, zoals kan voorkomen tijdens ziekte of voor een operatie. Uitgaande van het werkingsmechanisme van Victoza zou er geen hypoglycemie optreden tijdens een periode van vasten. In de praktijk is dit echter nog onzeker. Door dit onderzoek kunnen we u een veilig advies geven over het gebruik van Victoza bij bijvoorbeeld een operatie.

Vorbereiding

Voor het onderzoek wordt u drie dagen opgenomen in het ziekenhuis.

Op de dag dat u wordt opgenomen op de afdeling meet u thuis zelf uw bloedsuiker als u nuchter bent. Daarna mag u ontbijten en uw gebruikelijke diabetesmedicatie innemen.

Bij opname op de afdeling neemt de verpleegkundige een korte vragenlijst (anamnese) met u door. Daarna krijgt u een infuus ingebracht in uw linker- of rechterarm. Dit is een dun plastic buisje dat wordt ingebracht in een bloedvat van uw onderarm.

Gebruikt u medicijnen? Wij verzoeken u vriendelijk om uw eigen medicijnen in de originele verpakking mee te nemen. De afdelingsarts bepaalt of u de medicatie voor, tijdens of na het onderzoek inneemt.

Het onderzoek

Op de dag van opname (dag één) wordt er om 10.00 uur een glucosemeting gedaan. Via uw infuus kan er regelmatig bloed worden afgenomen voor een glucose- en insulinemeting.

Vanaf 12.00 uur wordt er volgens een opgesteld schema bloed afgenomen via het infuus. U krijgt uw maaltijden ook volgens een bepaald schema.

Om 16.00 uur stopt u met de sulfonylurempreparaten (SU) die u gebruikt voor uw diabetes, tot na de bloedafname van 8:00 op dag drie. Middelen die hier onder vallen zijn glibenclamide, gliclazide, glimepiride en tolbutamide.

Na 0.00 uur (het begin van dag twee) blijft u nuchter. Dit houdt in dat u niets meer mag eten en drinken, behalve water. Dit duurt tot na de bloedafname van 8.00 uur op dag drie van de opname. De bloedafnames gaan door tot 12.00 uur op de derde dag.

Na het onderzoek

Zodra het onderzoek is afgerond, verwijdert de verpleegkundige uw infuus. U mag na het onderzoek weer alles eten en drinken. De verpleegkundige biedt u iets te eten en te drinken aan. Zodra u wat genuttigd heeft, mag u naar huis.

De uitslag

De uitslag van het onderzoek krijgt u van uw behandelend internist tijdens een bezoek aan de polikliniek, ongeveer drie weken na de opname. Als u nog geen afspraak hiervoor heeft, laat de verpleegkundige deze voor u maken.

Vragen?

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Stelt u ze dan gerust aan de verpleegkundige die (de voorbereiding van) het onderzoek bij u doet.

Telefoonnummer

Afdeling A6 Infectieziekten / Endocrinologie / Reumatologie
Rijnstate Arnhem: 088 - 005 6711

Bij Rijnstate kunt u telefonisch en voor de meeste specialismen via www.rijnstate.nl uw afspraak maken.

Rijnstate,
uw ziekenhuis in de
regio Arnhem, Rheden
en De Liemers.

 @rijnstate

 facebook.com/rijnstate

Rijnstate

Postbus 9555

6800 TA Arnhem

T 088 - 005 8888

E info@rijnstate.nl

www.rijnstate.nl