

Botoxbehandeling van de blaas

Uw behandelend arts heeft bij u de diagnose 'overactieve blaas' gesteld. In deze folder vindt u informatie over de behandeling met botuline-toxine.



Rijnstate

*Neem altijd uw
verzekeringsgegevens
en identiteitsbewijs mee!*

Inleiding

Een 'overactieve blaas' betekent dat u vaak moet plassen en dat het plassen meestal vooraf wordt gegaan door hevige aandrang. Het is zelfs mogelijk dat u af en toe de urine niet kunt ophouden. Hiervoor bent u al behandeld met bijvoorbeeld medicijnen, bekkenbodemtherapie of elektrotherapie. Als geen van deze behandelingen voldoende helpt, kan de toediening van botuline-toxine (botuline) uitkomst bieden.

Vorbereiding

Voordat de botoxbehandeling wordt gepland, moet u zichzelf kunnen katheteriseren. De instructieverpleegkundige op de poli Urologie leert u dit aan. Voor deze instructie maakt u een afspraak op de poli. Bij de instructie krijgt u ook materialen mee naar huis die u nodig heeft na de behandeling.

Dag van behandeling

We adviseren u gemakkelijke kleding aan te doen. Een pyjama is niet nodig. Voor de behandeling meldt u zich eerst bij de opnamebalie. Op de afdeling Urologie krijgt u vervolgens een katheter. Via deze katheter wordt verdoovingsvloeistof (lidocaine) in uw blaas gebracht. Er wordt een stop op de katheter gedaan zodat de vloeistof in de blaas blijft en inwerkt op de binnenkant van de blaas. Dit inwerken duurt ongeveer 60 minuten. Ook krijgt u een antibioticumtablet (Ciproxin) om infectie te voorkomen. Daarna wordt u op de afgesproken tijd met een rolstoel naar de poli Urologie gebracht.

Wat is botuline?

Botuline-toxine is een medicinale stof die de signaaloverdracht van zenuwvezels naar spieren onderbreekt. De werking van botuline kunt u vergelijken met het doorknippen van de telefoonlijn bij u thuis. Als de lijn wordt doorgeknipt kunt u geen telefoongesprek meer voeren. Als botuline in een spier wordt gespoten, kan die spier geen signaal meer ontvangen en wordt daardoor verlamd. In de urologie wordt botuline gebruikt voor de behandeling van een overactieve blaasspier. Na injectie van botuline in de blaasspier verdwijnen bij ongeveer tachtig procent van de patiënten de klachten ten gevolge van een overactieve blaas. De productnaam van het botuline-toxine, die door de afdeling Urologie van Rijnstate wordt gebruikt, is Dysport®.

Hoe wordt botuline toegediend?

Op de polikliniek wordt u gevraagd om u van onderen uit te kleden (schoenen, broek, onderbroek) en plaats te nemen op een onderzoekstoel met beensteunen. De verpleegkundige verwijdert de katheter en reinigt de uitgang van de plasbuis met behulp van gaasjes met water. De arts brengt de blaaskijker via de plasbuis naar de blaas. Door een dun kanaaltje van de kijker wordt een lange injectienaald naar binnen geschoven waarmee de arts op vijftien verschillende plekken in de blaas een zeer kleine hoeveelheid botuline in de blaaswand spuit.

Na de behandeling

Nadat u van de behandelstoel bent geholpen, kunt u zich dan aankleden. De arts bespreekt de behandeling verder met u. Vervolgens wordt u teruggebracht naar de afdeling waar u bent opgenomen. Als u heeft geplast en er niet meer dan honderd milliliter urine in de blaas is achtergebleven, mag u naar huis. Dit wordt met een echo gecontroleerd.

Blijft er meer dan honderd milliliter urine in de blaas achter en blijft dit zo bij meerdere keren plassen dan moet u de blaas een paar keer per dag met een katheter leeghalen zoals u is geleerd door de instructieverpleegkundige. Uiteraard ontvangt u hierover nog aanvullende informatie voor u met ontslag gaat.

Effecten van de ingreep

Soms kan na injectie van botuline-toxine de urine iets bloederig zijn. We adviseren u na de behandeling daarom wat extra te drinken.

Het effect van de injectie is na drie dagen tot drie weken te merken. De behandeling is effectief bij ongeveer tachtig procent van de patiënten. Helaas werkt botuline maar drie tot twaalf maanden. Als het is uitgewerkt, kan de behandeling worden herhaald.

Bij sommige patiënten werkt de botuline zó goed dat zij enige tijd niet goed kunnen plassen en daarom zichzelf enkele malen per dag moeten katheteriseren. Met het uitwerken van de botuline komt echter ook het vermogen om zelf weer te kunnen plassen langzaam terug.

Vragen

Als u na het lezen van deze folder nog vragen hebt, bespreek deze dan vóór de behandeling met uw arts. U kunt hiervoor telefonisch contact opnemen met de polikliniek Urologie.

Telefoonnummer

Polikliniek Urologie Rijnstate Arnhem:

088 - 005 7705

Bezoekadres

Rijnstate Arnhem

Wagnerlaan 55

6815AD Arnhem

Bij Rijnstate kunt u telefonisch en voor de meeste specialismen via www.rijnstate.nl uw afspraak maken.

Rijnstate,
uw ziekenhuis in de regio
Arnhem, Rheden en De
Liemers.

 @rijnstate

 facebook.com/rijnstate

Rijnstate

Postbus 9555

6800 TA Arnhem

T 088 - 005 8888

E info@rijnstate.nl

www.rijnstate.nl