

Tetanusvaccinatie

Wanneer u zich verwondt, loopt u kans besmet te worden met tetanus. Dat is een infectieziekte die gepaard gaat met spierkrampen en ernstige gevolgen kan hebben. Injecties met een bepaalde antistof, het tetanusvaccin, kan deze ziekte voorkomen. Het tetanusvaccin bevat tetanus-toxoïd en wordt soms in combinatie met immunoglobuline gegeven. Een tetanusvaccinatie is een beperkte periode werkzaam.



Rijnstate

*Neem altijd uw
verzekeringsgegevens
en identiteitsbewijs mee!*

Voor wie bestemd

Iedereen die zich met een wond(je) op de afdeling Spoedeisende hulp van Rijnstate Arnhem meldt, wordt gevraagd naar de datum van de laatste tetanusvaccinatie. Dit geldt ook bij brandwonden. Vervolgens wordt bekeken of een injectie tegen tetanus noodzakelijk is. In sommige gevallen is dat snel duidelijk. Kinderen zijn bijvoorbeeld op negenjarige leeftijd volledig gevaccineerd tegen tetanus. Militairen worden bij de indiensttreding gevaccineerd. Mensen die naar de tropen gaan, krijgen vaak een combinatie van vaccins toegediend (DTP). In bepaalde landen wordt het tetanusvaccin gegeven in combinatie met het poliovaccin.

De tetanusvaccinatie mag tijdens de zwangerschap worden toegediend. Ook wanneer u borstvoeding geeft, is er geen bezwaar tegen het vaccin.

Richtlijnen bij tetanusvaccinatie

Om te beoordelen of een tetanusvaccinatie nodig is, volgt de Spoedeisende hulp de richtlijnen van de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO). Volgens deze richtlijnen moet een tetanusvaccinatie binnen drie dagen (72 uur) na de verwonding worden toegediend. Tevens gelden de volgende richtlijnen:

- Bent u in de afgelopen tien jaar ingeënt tegen tetanus, dan heeft u geen vaccinatie nodig.
- Is de laatste inenting langer dan tien jaar geleden, dan krijgt u één injectie met tetanus toxoïd.
- Bent u nog nooit tegen tetanus ingeënt of weet u dat niet zeker, dan krijgt u één injectie met tetanus toxoïd en één injectie met immunoglobuline. Tevens krijgt u een herhalingsrecept.

Tetanus toxoïd en immunoglobuline zijn medicijnen die elkaars werking beïnvloeden. Daarom worden de injecties op verschillende plaatsen ingespoten.

Herhalingsinecties

U bent pas volledig tegen tetanus gevaccineerd na twee herhalingsinecties. Daarom krijgt u zo nodig een recept mee voor twee ampullen tetanus toxoid. De ampullen dient u zelf op te halen bij de apotheek en in de koelkast te bewaren. De eerste herhalingsinectie moet één maand na de eerste vaccinatie worden toegediend, de tweede na zeven maanden. Uw huisarts kan u deze herhalingsinecties geven.

Immunoglobuline	datum: ___ - ___ - _____
tetanus toxoid	datum: ___ - ___ - _____
1e herhalingsinectie	datum: ___ - ___ - _____
2e herhalingsinectie	datum: ___ - ___ - _____

Bijwerkingen

Over het algemeen heeft de tetanusvaccinatie geen vervelende bijwerkingen.

In een enkel geval kan het de volgende klachten veroorzaken:

- (spier)pijn, gevoeligheid op de injectieplaats
- lichte roodheid/zwelling op de injectieplaats
- zich niet lekker voelen gedurende een korte periode.

In uitzonderlijke situaties is er sprake van een allergische reactie. Ook wanneer u overgevoelig bent voor het vaccin of wanneer u koorts heeft, krijgt u de vaccinatie toegediend.

Wanneer astmatische patiënten een tetanusvaccinatie krijgen, kunnen hun klachten verergeren.

Vragen

Heeft u vragen over de tetanusvaccinatie, stel deze dan aan één van de medewerkers van de Spoedeisende hulp.

Telefoonnummers

Afdeling Spoedeisende Hulp

Rijnstate Arnhem: 088 - 005 66 80

Bij Rijnstate kunt u telefonisch en voor de meeste specialismen via www.rijnstate.nl uw afspraak maken.

Rijnstate

Postbus 9555

6800 TA Arnhem

T 088 - 005 8888

E info@rijnstate.nl

www.rijnstate.nl

Ziekenhuislocaties

Arnhem

Zevenaar

Velp

Dieren

Arnhem-Zuid