

Strumazol, propylthiouracil of carbimazol

Vanwege een te snel werkende schildklier heeft uw arts u strumazol of propylthiouracil (PTU) of carbimazol voorgeschreven. Helaas kunnen er ook bijwerkingen optreden bij het gebruik van deze medicatie. Hierover gaat deze folder.



Rijnstate

*Neem altijd uw
verzekeringsgegevens
en identiteitsbewijs mee!*

Welke bijwerkingen kunt u ondervinden?

U kunt last krijgen van jeuk en huiduitslag. Als dit het geval is, is het nodig dat u contact met ons opneemt.

In zeldzame gevallen kan het zijn dat het lichaam door de medicijnen minder witte bloedlichaampjes aanmaakt, waardoor er een verhoogd risico is op infecties. Dit risico is minder dan 1 op de 1000, maar het is wel erg belangrijk om op te reageren als deze bijwerking optreedt.

De klachten die hierbij horen, zijn koorts (temperatuur boven de 38.0) en keelpijn. Bij deze combinatie van klachten is het nodig dat u **direct** contact opneemt met uw behandelend arts of schildklierverpleegkundige, zodat nog dezelfde dag een bloedonderzoek kan plaatsvinden. Hiermee kunnen wij zien of u een gewoon griepje heeft of de bovengenoemde bijwerking.

Is het laatste het geval stopt u meteen met het medicijn.

Contact

Uw behandelend arts of schildklierverpleegkundige is bereikbaar via onderstaand telefoonnummer:

- Tussen 8.00- 17.00, polikliniek interne geneeskunde, tel: 088-005 3003
- Buiten kantooruren kunt u voor spoedgevallen contact opnemen met de Spoedeisende Hulp, via 088-005 6680
- Geeft u duidelijk aan dat u keelpijn en koorts heeft en vermeldde medicijnen die u gebruikt.
- Neem bij het bezoek aan het ziekenhuis uw gegevens mee en de medicijnen die u gebruikt.

Bij Rijnstate kunt u telefonisch en voor de meeste specialismen via www.rijnstate.nl uw afspraak maken.

Rijnstate,
uw ziekenhuis in de regio
Arnhem, Rheden en De
Liemers.
 @rijnstate
 facebook.com/rijnstate

Rijnstate
Postbus 9555
6800 TA Arnhem
T 088 - 005 8888
E info@rijnstate.nl
www.rijnstate.nl