

PRF van de perifere zenuw

U heeft samen met uw arts besloten dat u voor uw pijnklachten een PRF behandeling van de zenuw die verantwoordelijk wordt geacht voor uw pijnklachten, zult ondergaan. In deze folder vindt u informatie over het doel, het verloop en de mogelijke gevolgen van de behandeling.



Rijnstate

*Neem altijd uw
verzekeringsgegevens
en identiteitsbewijs mee!*

Algemeen

De behandeling vindt plaats in het Pijncentrum van Rijnstate Velp op de eerste etage. U meldt zich op het afgesproken tijdstip. Een verpleegkundige begeleidt u naar de behandelkamer en brengt u na afloop van de behandeling ook weer terug. U blijft na afloop nog enige tijd ter controle op het Pijncentrum. De behandeling zelf duurt meestal maximaal 15 minuten; de totale tijd die u doorbrengt op het Pijncentrum wisselt tussen een half uur tot hooguit 2 uur.

Behandeling

Na een lokale verdoving van de huid plaatst de anesthesioloog, onder röntgendoorlichting of echogeleid door middel van anatomische herkenningspunten, een naald bij de te behandelen zenuw. De arts controleert de plaats van de naald met behulp van kleine "teststroompjes". Als de naald goed staat, behandelt de anesthesioloog de zenuw met radiofrequente golven. Hierbij wordt gebruik gemaakt van 'pulsed RF' (PRF). Hierbij wordt de zenuw niet verhit. Pijnvermindering treedt op door vermindering van de geleidingscapaciteit van de zenuwen. De arts voert de behandeling zo uit dat het bewegingsapparaat intact blijft en alleen de zenuwen die verantwoordelijk zijn voor de pijngeleiding beïnvloed worden.

Eten en drinken voor de behandeling

In principe hoeft u voor dit onderzoek **niet** nuchter te zijn.

Complicaties

- Er kan een gevoelsvermindering optreden in het huidgebied van de behandelde zenuw. Over het algemeen herstelt zich dit binnen enkele maanden.
- De kans op complicaties, zoals infectie en bloeding ter hoogte van de injectieplaats, en allergische reacties is erg klein.

Bijwerkingen

Ten gevolge van de injectie kan er enige napijn optreden, die enkele dagen kan aanhouden. U kunt hiervoor een pijnstillert innemen zoals paracetamol. Volg voor de dosering altijd de aanwijzingen in de bijsluitert.

Resultaat

Het resultaat van de behandeling is pas na enkele dagen tot weken te beoordelen; in een aantal gevallen zal een herhaling of een aanvullende behandeling noodzakelijk zijn. Tijdens een controleafspraak bespreekt de verpleegkundige of de specialist het resultaat en mogelijke verdere behandeling met u.

Let op!

- Informeer uw arts of verpleegkundige vóór de behandeling over een (mogelijke) zwangerschap.
- Meld het vóór de ingreep als u allergisch bent voor jodium, contrastvloeistof of medicijnen.
- De dag van de behandeling mag u niet actief aan het verkeer deelnemen. Door de toegediende medicatie kan uw reactievermogen verminderd zijn. Zorgt u ervoor dat iemand u naar huis brengt.
- Als u antistollingsmiddelen (bloedverdunners) gebruikt (zoals Sintrom, Marcoumar of Acenocoumarol) waarvoor controle bij de trombosedienst noodzakelijk is, moet u hier (in overleg met uw trombosedienst) voor de behandeling mee stoppen.
- Als u bloedverdunners gebruikt buiten de trombosedienst om ,(zoals o.a Ascal, Acetylsalicylzuur, Plavix, Dabigatran, Rivaroxaban, Apixaban), dan vertelt uw behandelaar u of u tijdelijk met deze medicijnen moet stoppen.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u contact opnemen met het Pijncentrum.

Telefoonnummer

Het Pijncentrum is op werkdagen tussen 8.30 – 17.00 uur bereikbaar via tel.:
088 - 005 5311

Bij Rijnstate kunt u telefonisch en voor de meeste specialismen via www.rijnstate.nl uw afspraak maken.

Rijnstate,
uw ziekenhuis in de regio
Arnhem, Rheden en De
Liemers.

 @rijnstate

 facebook.com/rijnstate

Rijnstate

Postbus 9555

6800 TA Arnhem

T 088 - 005 8888

E info@rijnstate.nl

www.rijnstate.nl