

# Plaatsen van een choledochusstent

Binnenkort ondergaat u een behandeling op de afdeling Radiologie van Rijnstate, waarbij een choledochusstent wordt geplaatst. Een choledochusstent is een flexibel buisje, dat via de huid en de lever in de galwegen wordt geplaatst. De stent zorgt ervoor dat de gal in de darmen afvloeit. U krijgt dit buisje omdat de galafvoer belemmerd is. Dit kan verschillende oorzaken hebben. Uw arts kan u hier meer over vertellen. Het plaatsen van de choledochusstent gebeurt met behulp van echografie (geluidsgolven) en röntgendoorlichting.



Rijnstate

*Neem altijd uw  
verzekeringsgegevens  
en identiteitsbewijs mee!*

# Vorbereiding

De dag voor de behandeling wordt er bloed bij u afgenomen, om de stolling van uw bloed te controleren. Dit is van belang omdat uw lever aangeprikt wordt, tijdens de behandeling. Dit is een zeer bloedrijk orgaan. Als uw bloedstolling niet in orde is, kan het nodig zijn de behandeling uit te stellen.

Voor de behandeling dient u nuchter te zijn. U mag daarom vanaf twaalf uur de nacht voor de behandeling niet meer eten, drinken of roken.

Via een infuusnaaldje in uw arm krijgt u één uur voor de behandeling antibiotica toegediend. Voordat u naar de afdeling radiologie wordt gebracht, krijgt u een operatiejasje aan.

# Gang van zaken

Een medewerker van het ziekenhuis brengt u met bed naar de afdeling Radiologie. Daar wordt u gevraagd om op de onderzoekstafel te gaan liggen. U krijgt aan uw vinger een "klemmetje" (een saturatiemeter), zodat tijdens het onderzoek het zuurstofgehalte in u bloed in de gaten kan worden gehouden. De radioloog bekijkt met een echo waar en in welke richting hij moet prikken. Via een infuusnaaldje krijgt u een rustgevend middel en een pijnstillertjes ingespoten. U kunt hier doezelig van worden. Uw huid wordt plaatselijk verdoofd. Via een zeer dunne, flexibele naald brengt de radioloog contrastvloeistof in de galwegen. Zo kunnen de galwegen in beeld worden gebracht. De radioloog brengt een voerdraad in de galwegen en probeert zo de vernauwing te passeren. Indien dit lukt, kan de radioloog het buisje (de stent) plaatsen. U krijgt hiervoor eerst nog wat extra pijnstilling, zodat het inbrengen van de stent minder pijn doet.

Wanneer het plaatsen van de stent niet lukt, is het soms noodzakelijk de galvloeistof af te laten vloeien via een drain, een dun slangetje.

Deze drain loopt door de huid naar een opvangzak. Na enkele dagen wordt nogmaals geprobeerd, een stent in de galwegen te plaatsen, waardoor de gal in de darmen kan afvloeien. De drain wordt daarna verwijderd.

## **Duur van de behandeling**

Afhankelijk van de ligging en bereikbaarheid van de galwegen duurt de behandeling ongeveer één a twee uur.

## **Na de behandeling**

Direct na de behandeling wordt u naar de verpleegafdeling teruggebracht. Daar komt u langzaam bij van de behandeling. De verpleegkundige komt regelmatig naar u kijken en controleert uw pols, temperatuur, bloeddruk en het wondje.

De eerste vier uur na de behandeling heeft u strikte bedrust.

Als het rustgevend middel is uitgewerkt, mag u, na toestemming van de arts, weer drinken en eventueel eten. Uw arts komt dan ook vertellen hoe de behandeling is verlopen.

## **Overgevoeligheid/allergie**

Mocht u overgevoelig zijn voor bepaalde stoffen, meldt dit dan voor het onderzoek bij de radiologisch laborant(e).

# Vragen

Als u vragen heeft over de behandeling, stel deze dan gerust aan de verpleegkundige, de arts of de radiologisch laborant(e). Zij zullen uw vragen graag beantwoorden.

## Telefoonnummers

Poli Interne geneeskunde: 088 - 005 77 50

Afdeling Radiologie: 088 - 005 77 95

Bij Rijnstate kunt u telefonisch en voor de meeste specialismen via [www.rijnstate.nl](http://www.rijnstate.nl) uw afspraak maken.

### **Rijnstate**

Postbus 9555

6800 TA Arnhem

T 088 - 005 8888

F 088 - 005 7878

[www.rijnstate.nl](http://www.rijnstate.nl)

### **Ziekenhuislocaties**

Arnhem

Zevenaar

Velp

Dieren

Arnhem-Zuid