

Midline infuus

U heeft zojuist te horen gekregen van uw behandelaar dat u in aanmerking komt voor een midline infuus. In deze folder vindt u hierover meer informatie.



Rijnstate

**Neem altijd uw
verzekeringsgegevens
en identiteitsbewijs mee!**

Wanneer krijgt u een midline

Het is mogelijk dat u tijdens uw opname in het ziekenhuis een Midline infuus krijgt. Hiervoor wordt gekozen als u moeilijk te prikken bent of als u langdurig een infuus nodig heeft tijdens uw verblijf in het ziekenhuis. De arts of verpleegkundige overlegt hierover met het IV-team.

Wat is een Midline infuus

Een Midline infuus is een zeer flexibele infuuslijn van ongeveer 25 cm. Deze wordt ingebracht in de linker of rechter elleboogplooï. Door het zachte materiaal waarvan hij is gemaakt, is het mogelijk om uw arm te kunnen bewegen zonder er last van te hebben.

Prikken op de operatiekamer

Om er voor te zorgen dat de ingreep steriel plaatsvindt gebeurt dit in de operatiekamer. U wordt door een medewerker patiëntenvervoer in bed naar de operatiekamer gebracht op een afgesproken tijdstip. U bent hiervoor ongeveer een half uurtje van de afdeling af.

Werkwijze

U blijft in uw bed liggen tijdens het prikken. Zo kunt u zich goed ontspannen. De verpleegkundige bekijkt samen met u in welke elleboog u het beste geprikt kan worden.

Uw arm moet gedesinfecteerd worden, daarom is het van belang dat u van tevoren aangeeft of u allergisch bent voor desinfectans (chloorhexidine).

De desinfectans die wij gebruiken is roze van kleur en geeft een verkleuring van de huid gedurende enige tijd. De arm wordt afgedekt met een steriele doek waarna uw bloedvat aangeprikt kan worden. Het slangetje wordt opgeschoven en de Midline is geplaatst.

Controle

Dagelijks wordt het Midline infuus gecontroleerd door de verpleegkundige op de afdeling. Twee maal per week komt de IV-verpleegkundige bij u op de afdeling langs om de lijn te controleren.

Bij welke klachten mag u de verpleegkundige aanspreken?

Bij het inspuiten van vloeistoffen mag u geen pijn hebben. Is dit wel het geval, meld u dit dan aan de verpleegkundige van de afdeling. De Midline kan mogelijk zijn gaan ontsteken.

Soms ervaren mensen een beurs gevoel in de bovenarm. Als dit het geval is binnen 24-28 uur na het prikken van de Midline, is er meestal sprake van een vaatspasme.

Het toedienen van warmte (hotpack) op bovenarm en hoogleggen van de arm in combinatie met rust, zou de klachten moeten verminderen. Als de klachten niet verminderen is het mogelijk dat de Midline verwijderd moet worden.

Bij vragen kan uw verpleegkundige contact opnemen met het IV-Team.

Bij Rijnstate kunt u telefonisch en via www.rijnstate.nl uw afspraak maken

Rijnstate

Postbus 9555

6800 TA Arnhem

T 088 - 005 8888

F 088 - 005 7878

www.rijnstate.nl

Ziekenhuislocaties

Arnhem

Zevenaar

Velp

Dieren

Arnhem-Zuid