

Metacholine- provocatietest Kind

In overleg met je kinderarts heb je besloten binnenkort een longfunctieonderzoek te ondergaan, de Metacholineprovocatietest. Bij dit onderzoek kijken wij of er sprake is van een verhoogde prikkelbaarheid van je luchtwegen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de stof metacholine. Dit is een prikkelende, maar onschadelijke stof.

Informatie voor kind en ouders/verzorgers



Rijnstate

*Neem altijd uw
verzekeringsgegevens
en identiteitsbewijs mee!*

Vorbereiding thuis

- Je hoeft niet nuchter te zijn voor dit onderzoek; je mag gewoon eten en drinken.
- Het is verstandig de laatste 30 minuten vóór het onderzoek niet te sporten of andere lichamelijke inspanning te verrichten.

Medicatie

Als je onderstaande medicijnen gebruikt, moet je hiermee stoppen voor het onderzoek.

72 uur van tevoren geen:

Singulair (Montelukast) en Tavegil;

36 uur van tevoren geen:

Flutiform, Foradil, Foster, Oxis, Seretide, Relvar of Symbicort;

8 uur van tevoren geen:

Aerolin, Airomir, Atrovent, Berodual, Berotec, Bricanyl, Combivent, Salbutamol, Ventolin.

Let op:

Wanneer je in de periode van zes weken voorafgaand aan het onderzoek een astma-aanval hebt gehad, of antibiotica of prednison hebt gebruikt, overleg dan op tijd met je kinderarts of het zinvol is om de test door te laten gaan.

Gezien de aard van de test mag er hooguit één begeleider aanwezig zijn bij het onderzoek. Het is niet toegestaan om jongere broertjes of zusjes mee te nemen. Er is een mogelijkheid tot opvang bij kinderopvang het Ballonnetje in het atrium van het ziekenhuis (dit geldt alleen voor Rijnstate Arnhem).

Melden

Voor het onderzoek in Rijnstate Arnhem kun je je melden bij de balie van de afdeling Longfunctie (Route 11). Voor het onderzoek in Rijnstate Ziekenhuis Zevenaar kun je je melden bij de Longpoli op de eerste verdieping. Neem jouw Rijnstatekaart en identiteitsbewijs mee.

Onderzoek

Bij dit onderzoek adem je door een mondstuk dat verbonden is met een longfunctieapparaat en krijg je een klemmetje op je neus. Het klemmetje lijkt op een wasknijper.

Aan het begin zal de longfunctieanalist(e) je vragen een paar keer diep in te ademen en zo krachtig mogelijk weer uit te ademen. Daarna adem je, door middel van vernevelen, via het mondstuk Metacholine in. De Metacholine wordt in steeds sterkere oplossingen aangeboden.

Elke keer meet de analist(e) je longfunctie. Zo kan worden vastgesteld of deze stoffen eventuele astmatische klachten (hoesten en of benauwdheid) kunnen opwekken. Als benauwdheid optreedt, geeft de analist(e) je zo spoedig mogelijk een luchtwegverwijderer waardoor je benauwdheid verdwijnt. Het onderzoek duurt 45 tot 75 minuten.

Na het onderzoek

Je kunt tijdelijk wat last hebben van lichte keelpijn, prikkelhoest of heesheid en misschien ook van wat spierpijn.

Uitslag

Je kinderarts bespreekt de uitslag van de test met jou en je ouders tijdens je eerstvolgende controlebezoek op de polikliniek.

Vragen

Deze folder is niet bedoeld als vervanging van mondelinge informatie, maar als aanvulling daarop. Hierdoor is het mogelijk om thuis alles nog eens rustig na te lezen. Heb je nog inhoudelijke vragen of opmerkingen, neem dan contact op met de afdeling Longfunctie via onderstaande telefoonnummers van de afdeling Longfunctie.

Telefoonnummers afdeling Longfunctie

Rijnstate Arnhem/Arnhem-Zuid/Velp: 088- 005 7790

Rijnstate Ziekenhuis Zevenaar 088- 005 9627

Contact

Als je een afspraak bij de afdeling Longfunctie in Rijnstate Arnhem of Rijnstate Arnhem-Zuid wilt maken of wijzigen, dan kun je bellen naar de Kinderpoli.

Telefoonnummers Kinderpoli

Rijnstate Arnhem: 088 - 005 7782

Rijnstate Ziekenhuis Zevenaar: 088 - 005 9704

Bij Rijnstate kunt u telefonisch en voor de meeste specialismen via www.rijnstate.nl uw afspraak maken.

Rijnstate,
uw ziekenhuis in de regio
Arnhem, Rheden en De
Liemers.

 @rijnstate

 facebook.com/rijnstate

Rijnstate

Postbus 9555

6800 TA Arnhem

T 088 - 005 8888

E info@rijnstate.nl

www.rijnstate.nl