

Hystero-salpingografie (H.S.G.)

Met deze folder willen wij u informeren over het HSG-onderzoek, dat plaatsvindt op de afdeling Radiologie. Deze folder beschrijft het onderzoek, de eventuele risico's en bijwerkingen in algemene zin. Dit röntgenonderzoek maakt het mogelijk om met behulp van een contrastvloeistof afbeeldingen te maken van de vorm van uw baarmoederholte, de eileiders en de doorgankelijkheid van uw eileiders.



Rijnstate

*Neem altijd uw
verzekeringsgegevens
en identiteitsbewijs mee!*

Vorbereiding

Voor het maken van een afspraak neemt u contact op met de polikliniek Voortplantingsgeneeskunde van Rijnstate via telefoonnummer 088 - 005 6495. In overleg wordt de datum en tijd voor het onderzoek met u vastgesteld. Het is belangrijk dat u op het moment van het onderzoek niet zwanger bent. Dit betekent dat we het onderzoek ruim voor uw ovulatie proberen te plannen. Als dat niet mogelijk is en het onderzoek na de ovulatie plaatsvindt, moet u condooms gebruiken tot na het onderzoek.

Het onderzoek kan krampen van de baarmoeder opwekken. Dit veroorzaakt menstruatiepijn. Wij adviseren u pijnstillers te gebruiken (bijvoorbeeld Nerofen, Aleve of Ibuprofen). Neem deze één uur voorafgaand aan het onderzoek in. Het is mogelijk dat u zich na het onderzoek niet lekker voelt. Neem daarom iemand mee als begeleiding.

Gang van zaken

Het onderzoek wordt uitgevoerd door een gynaecoloog/fertiliteitarts en een radioloog. De arts brengt een speculum (eendenbek) bij u in de vagina en desinfecteert vervolgens de wand van de vagina en de baarmoedermond. Hierna brengt hij/zij een slangetje in de baarmoeder en spuit door dit slangetje contrastvloeistof in de baarmoeder waardoor de baarmoederholte en de eileiders zichtbaar worden. Het inspuiten van deze vloeistof kan een vervelend en/of pijnlijk gevoel geven. De radioloog maakt tijdens en na het inspuiten van de contrastvloeistof röntgenopnamen. U kunt meekijken op een monitor, waarbij u uitleg krijgt over wat u ziet.

Risico's

Infectie

Er is een zeer kleine kans op het ontstaan van een infectie van de eileider(s). Als bij u een verhoogd risico op het ontstaan van een infectie aanwezig is, bespreekt de gynaecoloog met u het preventief gebruik van antibiotica. U krijgt hiervoor dan een recept mee. Een infectie uit zich meestal in toenemende buikpijn, veranderde afscheiding en koorts (38° of meer). Mochten deze klachten ontstaan, neem dan direct contact op met Rijnstate. Tijdens kantooruren belt u met de polikliniek Voortplantingsgeneeskunde via telefoonnummer 088 - 005 8580. Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de dienstdoende gynaecoloog via telefoonnummer 088 - 005 6930.

Overgevoeligheid

Door het gebruik van jodiumhoudende contrastvloeistof kan er een allergische reactie ontstaan (minder dan 0,1%). Als u in het verleden een allergische reactie heeft gehad op jodiumhoudend contrast wilt u dit dan voor de start van het onderzoek aan ons melden? Het kan dan nodig zijn dat we voorzorgsmaatregelen treffen om de kans op herhaling van een allergische reactie zo klein mogelijk te maken.

Duur van het onderzoek

Het onderzoek duurt 15 minuten.

Nazorg

De ingespoten contrastvloeistof zal voor een deel teruglopen uit de vagina en voor een deel worden opgenomen en vervolgens weer uitgescheiden door het lichaam via de urine. U kunt u na het onderzoek wassen en u krijgt een maandverbandje om de olieachtige afscheiding op te kunnen vangen. Lichte buikpijn en een beetje bloedverlies zijn heel normaal in de eerste uren na afloop van het onderzoek.

Uitslag

Meestal vertelt de arts u direct wat de voorlopige resultaten van het onderzoek zijn. De definitieve uitslag krijgt u tijdens een volgend bezoek aan uw behandelend arts.

Zwangerschap

Als het mogelijk is dat u toch zwanger bent, neem dan contact op met de polikliniek Voortplantingsgeneeskunde. In sommige gevallen is het nodig om het onderzoek uit te stellen.

Vragen?

Als u nog vragen heeft, stel deze dan (eventueel telefonisch) voordat het onderzoek plaatsvindt aan de medewerkers van de polikliniek Voortplantingsgeneeskunde. Besluit u om het onderzoek niet te ondergaan, meldt dit dan bij de polikliniek Voortplantingsgeneeskunde. Als u wilt is een gesprek met uw behandelend arts natuurlijk ook mogelijk.

Telefoonnummers

- Polikliniek Voortplantingsgeneeskunde: telefoonnummer 088 - 005 6495, werkdagen van 8.30 tot 11.30 uur.
- Spoed: telefoonnummer 088 - 005 8580, werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur.
- Buiten kantooruren: telefoonnummer 088 - 005 6930.

Bij Rijnstate kunt u telefonisch en voor de meeste specialismen via www.rijnstate.nl uw afspraak maken.

Rijnstate,
uw ziekenhuis in de regio
Arnhem, Rheden en De
Liemers.
 @rijnstate
 facebook.com/rijnstate

Rijnstate
Postbus 9555
6800 TA Arnhem
T 088 - 005 8888
E info@rijnstate.nl
www.rijnstate.nl