

Hypospadiecorrectie

Binnenkort wordt uw kind opgenomen in het kindercentrum in verband met een hypospadië. In overleg met de arts heeft u besloten dat uw zoon hieraan zal worden geopereerd. Bij deze ingreep wordt de uitmonding van de urinebuis naar het uiteinde van de penis verlegd (hypospadiecorrectie).

Waar in deze folder over ouders gesproken wordt worden ook verzorgers bedoeld.

Informatie voor patiënten van Rijnstate Arnhem



Rijnstate

**Neem altijd uw
verzekeringsgegevens
en identiteitsbewijs mee!**

Vorbereiding

Het is belangrijk uw zoon goed voor te bereiden op wat komen gaat. Hij weet dan wat er gaat gebeuren en zal de opname en de operatie achteraf beter kunnen verwerken. Er zijn verschillende boekjes die u hierbij kunnen helpen. Deze zijn te verkrijgen bij de boekhandel en bibliotheek.

Informatiebijeenkomst

Daarnaast wordt u aangeraden met of zonder uw kind (vanaf drie jaar) op de speciale informatiebijeenkomst te komen. Een verpleegkundige of een pedagogisch medewerkster geeft dan informatie over de algemene voorbereiding op de operatie. Tevens wordt de film 'Naar het ziekenhuis en dan' vertoond. Deze film vertoont de opname, de voorbereiding op de operatie en de narcose van twee kinderen die in Ziekenhuis Rijnstate worden opgenomen.

Deze informatiebijeenkomst vindt elke donderdagmiddag plaats op de unit kinderdagbchandeling. Het begint om 15.30 uur en is om 16.15 uur afgelopen. Desgewenst kunt u hierna met uw kind het kindercentrum bekijken. Wilt u wel even van tevoren doorgeven op welke donderdagmiddag u aanwezig bent? U kunt zich aanmelden bij de balie van de kinderafdeling of per telefoon: 088 - 005 89 19 of 088 - 005 69 63.

POS-balie

Nadat de arts uw zoon heeft aangemeld voor de operatie, krijgt u een oproep om met uw kind de pos-balie te bezoeken (POS staat voor pre operatieve screening). Hier noteert een assistent van de anesthesist gegevens van uw zoon die van belang zijn voor een goed verloop van de narcose en de operatie. U krijgt een folder mee over anesthesie bij kinderen. Er is alle gelegenheid om uw vragen te stellen.

Opname

De dag voor de operatie wordt u 's middags na 14.00 uur gebeld door een medewerkster van het kindercentrum. Zij vertelt u hoe laat uw kind de volgende dag in het ziekenhuis wordt verwacht en vanaf welk tijdstip hij niet meer mag eten en drinken. Als u nog vragen heeft, zal zij deze graag beantwoorden.

Op de opnamedag meldt u zich bij de opnameafdeling. Daarna gaat u met uw zoon naar het kindercentrum. Daar brengt de verpleegkundige u beiden naar zijn kamer en noteert de nodige gegevens over uw kind.

Voor de operatie

Een half uur voor de operatie krijgt uw zoon een zetpil om pijnklachten te voorkomen en neusdruppels die de luchtwegen verwijderen. Hij krijgt ziekenhuiskleding of een eigen pyjama aan.

Tijdens het in slaap brengen mag een van de ouders bij het kind blijven totdat hij slaapt. Sommige kinderen zijn erg onrustig als ze onder narcose worden gebracht. Ook bij het wakker worden kan een kind soms onrustig of paniekerig zijn. Zo nodig krijgt uw kind een zetpil met een rustgevend medicijn.

Na de operatie

Als de operatie klaar is, mag een van de ouders naar de uitslaapkamer. U mag bij uw zoon blijven, totdat hij wakker genoeg is om naar het kindercentrum terug te gaan.

Op de afdeling

Uw zoon heeft een infuus om voldoende vocht binnen te krijgen. Op de afdeling krijgt hij wat te drinken. Als hij niet misselijk is, mag hij al snel weer wat eten. Goed drinken kan een urine infectie en het verstopen van de katheter voorkomen. Als uw kind voldoende drinkt, mag het infuus eruit.

Suprapubiskatheter

Om de wond in de penis goed te laten herstellen, wordt de urine uit de blaas via een slangetje (suprapubis katheter) door de buikhuid afgevoerd. Deze katheter kan blaaskrampen veroorzaken. Om dit te voorkomen, krijgt uw kind drie keer per dag een drankje, oxybutinine of dridase. Zolang hij de katheter heeft, moet hij dit drankje gebruiken.

Splint

In de nieuw aangelegde plasbuis zit een plastic buisje (splint). Die zorgt ervoor dat de plasbuis openblijft. De splint zit met een kleine hechting vast aan de penis.

Verband

Een verband om de penis beschermt de wond en vermindert de zwelling. Dit verband blijft meestal drie dagen zitten. Als uw kind luierdragend is, krijgt hij twee luiers aan. De binnenste kleine luier voorkomt zoveel mogelijk dat het verband om de penis vies wordt als uw kind ontlasting krijgt. De ontlasting wordt in de binnenste luier opgevangen. De verpleegkundige zal regelmatig het verband, de splint en de katheter controleren.

Als uw kind aan het verband en of de katheter gaat trekken kan het nodig zijn om een of beide handen te fixeren met bijvoorbeeld een spalkje. Om te voorkomen dat er iets met de wond of katheter gebeurt, mag uw zoon niet rondlopen. Hij mag wel met bed of in de buggy naar de speelkamer. Hier zijn pedagogisch medewerkers die samen met u zoeken naar een voor hem passend spel of ontspanningsmogelijkheden.

Verwijderen verband en splint

Drie dagen na de operatie worden de splint en het verband verwijderd. Ongeveer één uur voordat de splint wordt verwijderd, krijgt uw kind paracetamol om eventuele pijnklachten zoveel mogelijk te voorkomen. In bad worden het verband en de oude bloedresten losgeweekt. Zo kan het verband eenvoudig worden verwijderd. De hechting van de splint wordt doorgeknipt, waarna de splint wordt verwijderd. Er komt geen verband meer om de penis. Om te voorkomen dat deze aan de luier vastkleeft, doet de verpleegkundige daar wat vaseline in de luier.

Weer naar huis

Over het algemeen blijft de suprapubis katheter tien dagen zitten. Als uw zoon naar huis gaat, wordt er eventueel een kleine urine beenzak met de katheter verbonden. Deze kan om het beentje worden vastgemaakt, zodat rondlopen thuis makkelijker gaat.

De verpleegkundige geeft u uitleg en instructies over de verzorging van de katheter en het verband op de buik. Zij leert u hoe u thuis de slang moet afklemmen. Als dit duidelijk is en goed gaat, mag uw kind met ontslag.

U krijgt van de verpleegkundige een recept dridase mee. Zij vertelt u wanneer uw kind op de dagverpleging mag terugkomen om de katheter te laten verwijderen. Meestal gebeurt dit tien dagen na de operatie.

Thuis mag uw zoon in bad. Om infecties te voorkomen, mag er geen gebruik worden gemaakt van zeep of iets dergelijks.

Verwijderen suprapubis katheter

Vorbereiding

Een dag voordat de katheter zal worden verwijderd, belt een verpleegkundige van de unit kinderdagbehandeling u op om te vertellen hoe laat uw zoon daar wordt verwacht. Hij mag gewoon blijven eten en drinken.

Op de dag dat uw kind op de unit kinderdagbehandeling wordt verwacht, moet u thuis om 7.00 uur de klem op de katheter zetten. Zo zorgt u ervoor dat de urine in de blaas blijft. Laat uw kind thuis al veel drinken, zo kan de blaas zich goed vullen.

Opname

Voordat uw kind mag plassen, wordt er urine uit de katheter afgenomen. Dit wordt op het laboratorium onderzocht op ontstekingsverschijnselen. Zo nodig zal de arts antibiotica voorschrijven. Pas als uw kind geplast heeft, wordt de katheter verwijderd. Dit doet geen pijn.


De opening in de buik wordt verbonden met een drukverband om lekken te voorkomen. De verpleegkundige vertelt u hoe u thuis dit wondje moet verzorgen. De behandelend arts komt nog langs op de afdeling, of u gaat zelf met uw kind op de polikliniek bij hem langs. Als alles verder goed gaat mag uw kind naar huis.

Weer naar huis

De verpleegkundige maakt voor u een afspraak voor de nacontrole voor over 6 weken. De dridase mag nu gestopt worden.

Vragen

Als u naar aanleiding van deze folder nog vragen heeft, zal uw arts of de medewerkers van het kindercentrum deze graag beantwoorden.
Telefoonnummer zalenunit kindercentrum: 088 - 005 89 19.



Bij Rijnstate kunt u telefonisch en voor de meeste specialismen via www.rijnstate.nl uw afspraak maken.

Rijnstate

Postbus 9555
6800 TA Arnhem
T 088 - 005 8888
E info@rijnstate.nl
www.rijnstate.nl

Ziekenhuislocaties

Arnhem
Zevenaar
Velp
Dieren
Arnhem-Zuid