



**Naam:** .....

**Geb. datum:** .....

**Rijnstate**

Bovengenoemde patiënt(e) is op de afdeling reumatologie onder controle in verband met een aandoening waarvoor hij/zij momenteel Methotrexaat gebruikt. Hierbij attenderen wij u op bekende geneesmiddeleninteracties met Methotrexaat.

Er zijn verscheidene mechanismen, die bij zo'n interactie aanleiding kunnen geven tot een toename van toxiciteit van Methotrexaat. Dit kan zich onder andere uiten in afwijkingen in het bloedbeeld (tot zeer ernstige beenmergdepressie) en het ontstaan van een longontsteking (pneumonitis). Onderstaande geneesmiddelen mogen derhalve bij Methotrexaat gebruik absoluut niet gegeven worden.

Absolute contra indicatie:

- Bactrimel (Co-Trimoxazol)
- Trimetoprim
- Probenecid

Indien er toch een dringende reden is één van deze middelen voor te schrijven, verzoeken wij de voorschrijver eerst contact op te laten nemen met de afdeling Reumatologie. Ook bij andere medicijnen die mogelijk een interactie kunnen geven, graag telefonisch overleg.

De polikliniek Reumatologie is bereikbaar voor overleg op **telefoonnummer: 088-0055400**

## **Voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van Methotrexaat**

- Houdt u zich altijd aan de voorgeschreven laboratorium controles.
- In de volgende gevallen dan wel bij twijfel wordt geadviseerd contact op te nemen met de polikliniek Reumatologie of dienstdoende huisarts
  - o Heftig verloopende dan wel aanhoudende infecties
  - o Bij kortademigheid, een droge hoest en/of koorts
  - o Bij diarree of hevig braken. Het (tijdelijk) stoppen van de Methotrexaat kan noodzakelijk zijn.
- Het vaccineren met een vaccin dat levend verzwakt virus bevat wordt onder gebruik van Methotrexaat afgeraden. Meld uw GGD-arts/verpleegkundige dat u Methotrexaat gebruikt. De jaarlijkse griepvaccinatie valt niet onder deze voorzorgsmaatregel.
- Bij een kinderwens wordt gebruik van Methotrexaat (voor vrouwen en mannen) afgeraden
- Bij ernstige nier- en leverfunctiestoornissen mag Methotrexaat niet gegeven worden