

Naam:
Geboortedatum:
Medicijn:



Rijnstate

Bovengenoemde patiënt(e) is op de afdeling reumatologie onder controle in verband met een aandoening waarvoor hij/zij momenteel een Biological / JAK remmer gebruikt.

Hierbij attenderen wij u op het verhoogde risico op infecties tijdens behandeling met deze medicijnen. Infecties kunnen zich sneller ontwikkelen en/of een ernstiger beloop hebben.

Dit geldt ook voor tuberculose of andere opportunistische infecties.

Het is van belang om bij gebruik van één van deze middelen:

- tijdens een ernstige infectie het medicijn tijdelijk te stoppen
- voorafgaand aan een chirurgische dan wel tandheelkundige ingreep het medicijn in overleg met de behandelaar tijdelijk te stoppen. De duur is afhankelijk van het middel en het infectierisico bij de (geplande) ingreep

Ten aanzien van vaccinaties:

- levend verzwakte vaccins zijn gecontra-indiceerd en mogen niet gegeven worden
- de jaarlijkse griepvaccinatie wordt geadviseerd

De polikliniek Reumatologie is bereikbaar voor overleg op telefoonnummer **088-0055400**

Medicatie specifieke voorzorgsmaatregelen

TNF-alpha blokkers (oa Etanercept, Adalimumab, Infliximab, Golimumab, Certolizumab Pegol):

zijn gecontra-indiceerd bij matig tot ernstig hartfalen

Tofacitinib / Baricitinib: geven naast een verhoogd infectierisico een extra verhoogde kans op Herpes Zoster (gordelroos)

Tocilizumab: BSE en CRP stijgen niet of minder tijdens behandeling met dit middel en zijn dus géén betrouwbare parameters voor beoordeling van infecties. Bij het gebruik van dit middel is de kans op diverticulitis verhoogd.

Rituximab en Abatacept: in zeldzame gevallen kunnen deze middelen een ernstige herseninfectie (PML) veroorzaken. Verschijnselen zijn onder andere verwardheid, geheugenverlies, moeite met nadenken, evenwichtsverlies, krachtsverlies/zwakte aan één kant van het lichaam, wazig zien/verlies gezichtsvermogen. Bij genoemde symptomen graag direct contact.