



## Stoppen met medicijnen voor een allergologische huidpriktest

Hieronder vindt u informatie over de medicijnen waarmee u moet stoppen voor uw allergietest.

### Antihistaminica

Antihistaminica zijn medicijn tegen allergie of andere aandoeningen. Hier horen bijvoorbeeld ook reistabletten bij.

Het is belangrijk dat u **drie dagen voor uw allergietest** stopt met de volgende medicijnen:

<b>Merknaam</b>	<b>Medicijn</b>
Aerius	Desloratadine
Allerfree, Claritine	Loratadine
Atarax, Hydroxyzine	Hydroxyzine
Cinnipirine, Cinnarizine, Primatour	Cinnarizine
Marzine, Cyclizine, Primatour	Cyclizine
Dramamine	Dimenhydrinaat
Emesafene	Meclozine/Pyridoxine
Incidal, Mebhydroline	Mebhydroline
Fenistil	Dimetindeen
Kestine	Ebastine
Ketotifen, Zaditen	Ketotifen
Periactin	Cyproheptadine
Phenergan, Promethazine	Promethazine
Polaramine	Dexchlorfeniramine
Reactine, Zyrtec, Revalintabs	Cetirizine
Semprex	Acrivastine
Suprimal	Meclozine
Tavegil	Clemastine
Telfast	Fexofenadine
Triludan, Triludan Forte	Terfenadine
Xyzal	Levocetirizine
Nedeltran	Alimenazine
Mizollen	Mizolastine
Tinset	Oxatomide
Rupafin	Rupatadine

### Orale corticosteroiden

Orale corticosteroiden zijn ontstekingsremmende middelen.

Het is belangrijk dat u **één week voor uw allergietest** stopt met de volgende medicijnen:

<b>Merknaam</b>	<b>Medicijn</b>
Albicort	Triamcinolonacetonide
Celestone	Betamethason
	Cortison
Decadron	Dexamethason
Depo-Medrol	Betamethason
Di-Adreson	Prednisolon
Hydro-Adreson, Hydrocortison	Hydrocortison
Ledercort	Triamcinolon